

Fungicida sistémico que previene y controla



Tiabendafed[®]

50 S.C.



Suspensión Concentrada

Tiabendazole



Fungicida



FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROZCEROS

Tiabendafed®

50 S.C.



Ingrediente activo:

Tiabendazole

Nombre químico: 2-(Thiazol-4-YL) benzimidazole

Concentración: 500 gr/L

Grupo químico: Benzimidazole

Ventajas:

- Fungicida de amplio espectro para el control de Moho Gris (*Botrytis cinérea*) en cultivo de clavel
- TIABENDAFED 50 SC tiene propiedades preventivas y curativas.
- Fungicida sistémico, que permite movimiento del ingrediente activo en la planta.
- El producto se absorbe por raíces y hojas.

Mecanismo de acción:

Tiabendazole inhibe la división celular, afecta la formación del uso acromático, inhibe la mitosis ya que se une a la tubulina, de esta forma impide el desarrollo y crecimiento de los hongos.

Compatibilidad:

Es recomendable realizar pruebas de compatibilidad al realizar mezclas con otros plaguicidas o fertilizantes foliares

Fitotoxicidad:

TIABENDAFED 50 SC, no presenta fitotoxicidad a las plantas del cultivo si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta. Se recomienda realizar pruebas de fitotoxicidad en variedades de clavel.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de agua con los vapores de aspersión, residuos de aplicación, lavado de envases o lavado de los equipos de aspersión.

- Se deben respetar las franjas mínimas de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aérea distantes de los cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal o de cualquier otra área que requiera protección

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

DOSIS DE APLICACIÓN

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | P.C | P.R |
|---------|---|------------------|--------|---------|
| Arroz | Añublo de la vaina <i>Rhizoctonia solani</i> | 450 cc/Ha | 5 días | 4 horas |
| Clavel | Moho Gris <i>Botrytis cinérea</i> | 0.9 cc/L de agua | N.A. | 4 horas |

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO
 REGISTRO NACIONAL ICA No. 1987
 Titular del Registro: FEDEARROZ



CISPROQUIM - EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 • Bogotá: 288 6012



FEDEARROZ
 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCCEROS
 Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia
 www.fedearroz.com.co