

Efectivo control que perdura



Deltafed[®]

2.5 EC



Concentrado Emulsionable

Arroz - Papa - Maíz - Crisantemo - Pasto

Deltametrina



Insecticida de
rápida acción



Deltafed[®]

2.5 E.C



Ingrediente Activo:

Deltametrina:

- Nombre Químico: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilato.
- Concentración: 25 g/L de formulación.
- Grupo Químico: Piretroide

Ventajas

- Posee un rápido e intenso efecto insecticida.
- Efecto de choque sobre plagas.
- Actúa tanto por contacto como por ingestión.
- Baja cantidad de ingrediente activo para el control de plagas.

Modo y Mecanismo de acción:

DELTAMETRINA es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto sobre el sistema nervioso central. Es absorbido por la cutícula de los insectos postergando el cierre de los canales de sodio, produciendo una prolongada corriente de sodio durante el final de la despolarización causando su muerte.

Compatibilidad:

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y miscibilidad en pequeña escala.

Fitotoxicidad:

DELTAFED 2.5 EC no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones dadas en esta etiqueta

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/Ha	PC*	PR
Arroz	Cucarro <i>Eutheola bidendata</i>	0.3	17 días	12 horas
Pasto	Chinche de los pastos <i>Collaria columbiensis</i>	0.4	22 días	
Maiz	Gusano Cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5	17 días	
Crisantemo	Minador de la hoja <i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.4cc / Litro Agua	N/A	
Papa	Pulguilla <i>Epitrix cucumeris</i>	0.4	25 días	

PC: Periodo de carencia PR: Periodo de reentrada

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


- No contamine las fuentes de agua con los vapores de la aspersión, los desechos de la aplicación, lavado de envases o lavado de equipos de aspersión.

- Se deben respetar las franjas mínimas de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aérea distantes de los cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal o de cualquier otra área que requiera protección.

- DELTAFED 2.5 ES ALTAMENTE TOXICO A ABEJAS POR INGESTION Y POR CONTACTO, POR LO TANTO SE RECOMIENDA TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: No aplicar en época de floración, No aplicar cerca de apiarios, No aplicar en horas de actividad de las abejas.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTVELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERAMENTE PELIGROSO - DAÑINO
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1210
Titular del Registro: FEDEARROZ



CISPROQUIM - EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 • Bogotá: 288 6012



FEDEARROZ

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia
www.fedearroz.com.co